

Patient's Name: Magnet
Healthcare Provider: Jersey City Medical Center

Warfarine sodique, comprimé oral

Noms commerciaux aux États-Unis

Coumadin, Jantoven

La liste de noms peut ne pas comprendre tous les produits qui sont disponibles sur le marché.

Quel est ce médicament ?

La WARFARINE est un anticoagulant. Elle sert à traiter ou à prévenir la formation de caillots sanguins dans les veines, les artères, les poumons ou le cœur.

Ce médicament peut être utilisé pour d'autres indications ; adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions.

Que dois-je dire à mon fournisseur de soins avant de prendre ce médicament ?

Ils ont besoin de savoir si vous présentez l'une quelconque des affections ou situations suivantes :

- alcoolisme
- anémie
- problèmes hémorragiques
- cancer
- diabète
- maladie cardiaque
- hypertension artérielle
- antécédent de saignement dans le tractus gastro-intestinal
- antécédents d'accident vasculaire cérébral ou d'une autre lésion ou maladie affectant le cerveau
- maladie des reins ou du foie
- déficit en protéine C
- déficit en protéine S
- psychose ou démence
- blessure récente, intervention chirurgicale récente ou programmée
- réaction inhabituelle ou allergique à la warfarine
- réaction inhabituelle ou allergique à d'autres médicaments
- réaction inhabituelle ou allergique à des aliments, à des colorants ou à des conservateurs
- vous êtes enceinte ou cherchez à être enceinte
- vous allaitez

Comment dois-je utiliser ce médicament ?

Prenez ce médicament par voie orale avec un verre d'eau. Suivez les indications mentionnées sur l'emballage ou l'étiquette de prescription. Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture. Prenez ce médicament chaque jour à la même heure. Ne prenez pas ce médicament plus souvent que ce qui vous a été prescrit. N'arrêtez la prise de ce médicament que sur avis de votre médecin.

Un guide spécial de la FDA (MedGuide) vous sera remis par le pharmacien à chaque prescription et renouvellement de l'ordonnance (refill). Veillez à lire attentivement ces informations à chaque fois.

Interrogez votre pédiatre quant à l'utilisation de ce médicament chez l'enfant. Des précautions particulières peuvent s'avérer nécessaires.

Surdosage : si vous pensez avoir pris ce médicament en excès, contactez immédiatement un centre antipoison ou un service d'urgences.

REMARQUE : ce médicament vous est uniquement destiné. Ne partagez pas ce médicament avec d'autres personnes.

Que faire si je saute une dose ?

Il est important de ne pas sauter de dose. Si vous avez sauté une dose, contactez votre médecin ou votre fournisseur de soins. Prenez la dose dès que possible le jour même. S'il est presque l'heure de votre prochaine dose, ne prenez que cette dose-là. Ne prenez ni doubles doses, ni doses supplémentaires pour compenser une dose oubliée.

Quelles sont les interactions possibles avec ce médicament ?

Ne prenez pas ce médicament avec l'une quelconque des substances suivantes :

- agents utilisés dans la prévention ou la dissolution des caillots sanguins
- aspirine ou autres salicylates
- danshen
- dextrothyroxine
- mifépristone
- millepertuis (St. John's Wort)
- levure de riz rouge

Ce médicament peut également interagir avec les médicaments suivants :

- paracétamol (acetaminophen)
- agents induisant une baisse du cholestérol
- alcool
- allopurinol
- amiodarone
- antibiotiques ou médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes, fongiques ou virales
- azathioprine
- médicaments barbituriques utilisés pour induire le sommeil ou traiter les crises d'épilepsie