

Patient's Name: Magnet
Healthcare Provider: Jersey City Medical Center

Sól sodowa warfaryny tabletki doustne

Nazwy handlowe w USA

Coumadin, Jantoven

Lista nazw może nie uwzględniać wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży.

Co to jest za lek?

WARFARYNA jest lekiem hamującym krzepnięcie krwi. Lek jest także stosowany do zapobiegania zakrzepom w żyłach, tętnicach, płucach lub sercu.

Ten lek może być stosowany w innych celach; w przypadku pytań należy zapytać pracownika służby zdrowia lub farmaceutę.

O czym należy powiedzieć pracownikowi służby zdrowia przed zastosowaniem tego leku?

Musi wiedzieć, czy u pacjenta występuje jedna z następujących dolegliwości:

- alkoholizm
- niedokrwistość
- problemy z krwawieniami
- rak
- cukrzyca
- choroba serca
- wysokie ciśnienie krwi
- krwawienie z przewodu pokarmowego w przeszłości
- udar lub inny uraz lub choroba mózgu w przeszłości
- choroba nerek lub wątroby
- niedobór białka C
- niedobór białka S
- psychoza lub demencja
- niedawny uraz, niedawno przebyty lub planowany zabieg chirurgiczny lub operacja
- reakcja nietypowa lub alergiczna na warfarynę
- reakcja nietypowa lub alergiczna na inne leki
- reakcja nietypowa lub alergiczna na żywność, barwniki lub konserwanty
- w ciąży lub próbuje zajść w ciążę
- karmienie piersią

Jak należy stosować ten lek?

Lek należy przyjmować doustnie popijając szklanką wody. Postępować zgodnie z zaleceniami

podanymi na opakowaniu lub w ulotce. Lek można zażywać z jedzeniem lub bez. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. Nie należy przyjmować tego leku częściej niż zalecono. Nie przerywać przyjmowania leku, jeśli lekarz tego nie zaleci.

Z każdym lekiem lub jego uzupełnieniem farmaceuta wyda specjalny MedGuide. Za każdym razem należy dokładnie przeczytać te informacje.

Należy zwrócić się do lekarza pediatry w sprawie podawania tego leku dzieciom. Konieczna może być szczególna ostrożność.

Przedawkowanie: Jeśli pacjent sądzi, że przyjął zbyt dużą ilość leku, należy natychmiast skontaktować się z ośrodkiem leczenia zatruc lub oddziałem ratunkowym.

UWAGA: Lek został przepisany wyłącznie określonej osobie. Nie należy przekazywać go innym.

Co stanie się, jeśli pominę dawkę?

Ważne jest, aby nie pomijać żadnej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy zwrócić się do lekarza lub pracownika służby zdrowia. Należy przyjąć dawkę możliwie najwcześniej tego samego dnia. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć tylko tę dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej lub dodatkowej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Z czym lek może wchodzić w interakcje?

Nie należy przyjmować tego leku z żadnym z następujących:

- leki zapobiegające lub rozpuszczające zakrzepy krwi
- aspiryna lub inne salicylany
- szafwia czerwonokorzeniowa (danshen)
- dekstrotyroksyna
- mifepryston
- dziurawiec
- ryż czerwony

Lek może także wchodzić w interakcje z następującymi lekami:

- acetaminofen
- leki obniżające poziom cholesterolu
- alkohol
- allopurynol
- amiodaron
- antybiotyki lub leki stosowane w przypadku infekcji bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych
- azatiopryna
- leki barbituranowe ułatwiające zaśnięcie lub przeciwdrgawkowe
- niektóre leki przeciwcukrzycowe
- niektóre leki stosowane w przypadku problemów z rytmem serca
- niektóre leki stosowane w przypadku wysokiego ciśnienia krwi
- wodzian chloralu