

Patient's Name: Magnet
Healthcare Provider: Jersey City Medical Center

华法林钠口服片

美国商品名称

Coumadin, Jantoven

这份药品名称清单可能没有包括市场上供应的所有产品。

本药是什么？

华法林是一种抗凝血药。它用于治疗或预防静脉、动脉、肺或心脏中的血凝块。

本药可用于其它目的；如果您有任何问题，请咨询您的医疗服务提供人或药师。

在我服用本药之前，我应把什么情况告诉我的医疗服务提供人？

医生需要了解您是否有下述任何一种状况：

- 酒精中毒
- 贫血
- 出血问题
- 癌症
- 糖尿病
- 心脏疾病
- 高血压
- 胃肠道出血史
- 脑卒中史，或其它脑损伤或脑疾病史
- 肾脏疾病或肝脏疾病
- 蛋白质C缺乏
- 蛋白质S缺乏
- 精神病或痴呆
- 最近损伤，最近或已计划的外科治疗或手术
- 对华法林的异常反应或过敏反应
- 对其它药物的异常反应或过敏反应
- 对食物、染料或防腐剂的异常反应或过敏反应
- 已怀孕或准备怀孕
- 哺乳

我应如何使用本药？

用一玻璃杯水口服本药。遵照包装或处方标签上的指示。您可与食物一起服用本药，或不与食物一起服用本药。每天在同一时间服用本药。服用本药的次数不得多于指示的次数。不得停用本药，除非医生建议停药。

您的药师会随每份处方和每份再配药物给您提供一份特别的MedGuide。一定每次都要仔细阅读这份资料。

关于本药如何用于儿童，请咨询您的儿科医生。可能需要特别小心。

用药过量：如果您认为自己服用本药的量过多，请立即联系美国中毒控制中心或医院急诊室。

注意：本药仅供您使用。不得与其他人共用本药。

如果我遗漏一次剂量，怎么办？

重要的是不要遗漏任何一次剂量。如果您遗漏一次剂量，请联系您的医生或医卫职业人员。在当天尽可能马上服用该剂量。如果马上就是您下一剂时间，则仅服用下一剂量。不得加倍服药或服用额外的剂量以弥补遗漏的剂量。

什么可能会和本药发生相互作用？

本药不得与下述任何一项一起服用：

- 用于预防或溶解血凝块的药剂
- 阿司匹林或其它水杨酸类
- 丹参
- 右旋甲状腺素
- 米非司酮
- 圣约翰草
- 红曲米

本药也可能与下述药物发生相互作用：

- 对乙酰氨基酚
- 用于降低胆固醇的药剂
- 酒精
- 别嘌醇
- 胺碘酮
- 用于治疗细菌感染、真菌感染或病毒感染的抗生素或药物
- 硫唑嘌呤
- 用于诱导睡眠或治疗癫痫发作的巴比妥酸类药
- 用于糖尿病的一些药物
- 用于心脏节律问题的一些药物
- 用于高血压的一些药物
- 水合氯醛
- 西沙比利
- 双硫仑
- 雌性激素类，包括避孕药或避孕药丸
- 全身麻醉药
- 草药产品或饮食产品，如蔓越橘、大蒜、银杏叶、人参、绿茶或卡法根
- 流感病毒疫苗
- 雄性激素类
- 用于抑郁或精神病的药物
- 用于某些种类癌症的药物