

Patient's Name: Magnet
Healthcare Provider: Jersey City Medical Center

وارفارين الصوديوم أقراص تؤخذ عن طريق الفم

الأسماء التجارية الأمريكية

Coumadin, Jantoven

قد لا تشمل قائمة الأسماء كل المنتجات المتوفرة في السوق.

ما هذا الدواء؟

الورفرين مضاد للتجلط. يستخدم لمنع الجلطات في الأوردة أو الشرايين أو الرئتين أو القلب.

يمكن استخدام هذا الدواء لأغراض أخرى؛ اسأل مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي إذا كانت لديك أسئلة.

ما هي الأشياء التي يجب أن أخبر بها مقدم الرعاية الصحية قبل تناول هذا الدواء؟

هم بحاجة إلي معرفة ما إذا كنت مصابًا بأي من هذه الحالات الآن:

- إدمان الكحول
- أنيميا
- مشكلات النزيف
- السرطان
- السكر
- أمراض القلب
- ارتفاع ضغط الدم
- تاريخ مع النزيف في الجهاز الهضمي
- تاريخ مع السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الأخرى أو أمراضها
- أمراض الكلى أو الكبد
- نقص بروتين سي
- نقص بروتين إس
- الذهان أو الخرف
- جرح حديث أو جراحة أو إجراء جراحي حديث أو يخطط له
- رد فعل غير عادي أو حساسية ضد وارفارين
- رد فعل غير عادي أو حساسية ضد أدوية أخرى
- رد فعل غير عادي أو حساسية ضد الأطعمة أو الأصباغ أو المواد الحافظة
- حامل أو تسعين للحمل
- الرضاعة الطبيعية

كيف يجب عليّ استعمال هذا الدواء؟

تناول هذا الدواء بالفم مع كوب من الماء. اتّبع التعليمات الموجودة على العبوة أو ملصق الوصفة الطبية. يمكنك تناول هذا الدواء مع الطعام أو بدونه. تناول هذا الدواء في نفس الوقت كل يوم. لا تتناول هذا الدواء أكثر من المرات الموصوفة. لا توقف استعمال هذا الدواء إلا إذا نصح طبيبك بذلك.

سيقوم الصيدلي بإعطائك دليل طبي خاص عند صرف كل وصفة وعند إعادة وصفها. تأكد من قراءة هذه المعلومات بعناية في كل مرة.

تحدث إلي طبيب الأطفال بشأن استعمال هذا الدواء للأطفال. قد تكون هناك حاجة إلى عناية خاصة.

الجرعة الزائدة : إذا اعتقدت أنك تناولت كمية كبيرة جدًا من هذا الدواء، اتصل بمركز التحكم في السموم أو غرفة الطوارئ فورًا.

ملاحظة: يستخدم هذا الدواء من أجلك أنت فقط. لا تشارك آخرين معك في تناول هذا الدواء.

ماذا لو تركت (نسيت) جرعة؟

من المهم ألا تفوت جرعة. إذا فوّت جرعة، اتصل بطبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية. تناول الجرعة في أقرب وقت ممكن في نفس اليوم. إذا كان هذا وقت جرعتك التالية تقريبًا ، فتناول تلك الجرعة فقط. لا تتناول جرعات مزدوجة أو إضافية لتعويض جرعة فائتة.

ما هي الأشياء التي قد تتفاعل مع هذا الدواء؟

لا تناول هذا الدواء مع أي مما يلي:

- المواد التي تمنع أو تذيب تجلطات الدم
- الأسبرين أو ساليسيلات أخرى
- دانشين
- ديكستروثيروكسين
- ميفيبريستون
- نبتة سانت جونز
- أرز الخميرة الحمراء

هذا الدواء يمكن أن يتفاعل أيضًا مع الأدوية التالية:

- أسيتامينوفين
- المواد التي تقلل الكوليسترول
- الكحول
- ألوبيرونيل
- اميودارون
- المضادات الحيوية أو الأدوية التي تعالج العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية
- ازاثيوبرين
- أدوية الباربيتورات لتحفيز النوم أو معالجة النوبات
- بعض أدوية مرض السكر
- بعض أدوية علاج مشاكل نسق ضربات القلب
- بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم
- كلورال هيدرات
- سيسابريد
- دبسلفيرام
- هرمونات أنثوية، تشمل وسائل منع الحمل أو أقراص منع الحمل
- الأدوية المخدرة العامة
- منتجات عشبية أو غذائية مثل توت بري أو الثوم أو الجنكو أو الجنسنج أو الشاي الأخضر أو الكافا كافا
- لقاح فيروس الإنفلونزا
- هرمونات الذكورة