

**Patient's Name:** Magnet  
**Healthcare Provider:** Jersey City Medical Center

## 華法林鈉口服錠

### 美國商業名稱

Coumadin, Jantoven

此名稱清單可能未包含市面上可見的所有產品。

### 這是什麼藥物？

華法林 (WARFARIN) 是抗凝血劑。用來治療或預防靜脈、動脈、肺臟或心臟中的血塊。

本藥物可能有其他用途；若您有疑問，請詢問您的醫療人員或藥師。

### 服用此藥物之前，我必須告訴醫療人員什麼事？

他們必須知道您是否有下列狀況：

- 酒精中毒
- 貧血
- 出血問題
- 癌症
- 糖尿病
- 心臟疾病
- 高血壓
- 消化道出血病史
- 中風或其他腦部傷害或疾病病史
- 腎臟或肝臟疾病
- 蛋白質 C 缺乏
- 蛋白質 S 缺乏
- 精神病或失智症
- 最近曾受傷，最近或計劃接受手術或醫學程序
- 對華法林有不尋常或過敏反應
- 對其他藥物有不尋常或過敏反應
- 對食物、色素或防腐劑有不尋常或過敏反應
- 懷孕或正嘗試懷孕
- 哺乳中

### 我該如何使用此藥物？

以一杯水口服此藥物。請遵照包裝或處方標籤上的說明。有無進食都可服藥。每天於同一時間使用此藥物。請勿超過指示的頻率使用此藥物。若無醫師建議，請勿停止使用此藥物。

每次開立處方或重新領藥，您的藥師都會提供特殊的「病患用藥指引」(MedGuide)。請務必每次詳讀此資

訊。

請和您的小兒科醫師討論兒童使用此藥物的相關事宜。請特別小心。

用藥過量：若您認為您過量使用此藥物，請立即聯絡毒物控制中心或急診室。

注意：本藥物僅供您本人使用。請勿將此藥物與他人分享。

### 萬一錯過服藥時間該怎麼辦？

請務必不要錯過服藥時間。若您錯過一劑的服藥時間，請聯絡您的醫師或專業醫護人員。盡可能在同一天服用劑量。若時間接近第二劑的服藥時間，請僅服第二劑。不要服用兩份或過多劑量以彌補錯過的劑量。

### 哪些東西會與此藥物有交互作用？

不要搭配下列任一項服用此藥物：

- 預防或溶解血塊的製劑
- 阿斯匹靈或其他水楊酸鹽
- 丹參
- dextrothyroxine
- 美服培酮 (mifepristone)
- 聖約翰草
- 紅麴

此藥物亦可能與下列藥物有交互作用：

- 乙醯氨酚
- 降低膽固醇的製劑
- 酒精
- 安樂普利諾
- 胺碘酮
- 治療細菌、黴菌或病毒感染的抗生素或藥物
- azathioprine
- 誘發睡眠或治療癲癇發作的巴比妥酸鹽藥物
- 一些糖尿病藥物
- 一些心律問題藥物
- 一些高血壓藥物
- 水化氯醛 (chloral hydrate)
- 希塞普 (cisapride)
- 戒酒硫
- 女性荷爾蒙，包括避孕措施或避孕藥
- 一般麻醉劑
- 藥草或膳食產品，如蔓越莓、大蒜、銀杏、人蔘、綠茶或卡法椒
- 流感病毒疫苗
- 男性荷爾蒙
- 憂鬱症或精神病的藥物
- 特定癌症類型的藥物
- 胃部疾病藥物